


الترين الأول:

f دالة معرفة وقابلة للاشتراق على \mathbb{R} بعبارة الشكل: $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ ، (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعمد ومتجانس (\bar{j}, \bar{i}) ، (Δ) ماس للمنحنى (C_f) في النقطة A


بقراءة بيانية عين:

$$f'(0), f'(-1), f'(-2), f(0)$$

 2) جدول تغيرات الدالة f موضح في إشارة المشتقة

 3) معادلة المستقيم (Δ)

 4) الوضع النسيي للمنحنى (C_f) والمستقيم (Δ)

 5) حل في \mathbb{R} المتراجحة: $f(x) \cdot f'(x) \leq 0$

 6) عين العدين الحقيقيين a و b ثم تحقق من نتيجة السؤال 2

الترين الثاني:

f دالة عددية معرفة على $\mathbb{R} - \{-2\}$ بـ: $f(x) = \frac{-x+3}{x-2}$ تمثيلها البياني في معلم متعمد ومتجانس (\bar{j}, \bar{i})

 1) أ) أحسب $(f'(x))'$ وعين اشارتها ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f .

 ب) شكل جدول تغيرات الدالة f .

 2) اكتب معادلة للمستقيم (Δ) ماس المنحنى (C_f) عند النقطة التي فاصلتها 1

 3) أ) تتحقق أنه من أجل كل x من $\mathbb{R} - \{-2\}$: $f(x) = -1 + \frac{1}{x-2}$

 ب) اشرح كيف يمكن انشاء (C_f) انطلاقاً من (C) التمثيل البياني للدالة مقلوب

 4) بين ان النقطة $A(-2; 2)$ مركز تنازول للمنحنى (C_f)

 5) أنشئ (Δ) و (C_f)