

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:  
الموضوع الأول

التمرين الأول: ( 06 نقاط )

نعتبر الأعداد الطبيعية  $a, b$  و  $c$  حيث  $b = 1437$  ،  $a = 2016$  و  $c = 1954$

(1) عين باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد  $a$  ،  $b$  و  $c$  على 5.

(2) استنتج باقي القسمة الإقليدية لكل من الأعداد :  $a + b + c$  ،  $a \times b \times c$  ،  $a^4 + b^4$  و  $a^4 \times b^4$  على 5.

(3) أ) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $b^{4n} \equiv 1[5]$ .

ب) استنتج أن العدد  $1 - b^{2016}$  يقبل القسمة على 5.

(4) أ) تتحقق أن:  $c \equiv -1[5]$

ب) بين أن:  $c^{1438} + c^{2017} \equiv 0[5]$

التمرين الثاني: ( 06 نقاط )

( $u_n$ ) متتالية هندسية حدودها موجبة تماما ، معرفة على  $\mathbb{N}$  حيث  $u_1 = 20$  و  $u_3 = 320$ .

(1) بين أن أساس المتتالية  $(u_n)$  هو 4 وحدتها الأولى هو 5.

(2) اكتب عبارة الحد العام للممتالية  $(u_n)$  بدلالة  $n$  ثم استنتج قيمة حدتها السابع.

(3) أ) احسب بدلالة العدد الطبيعي  $n$  المجموع  $S$  حيث  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ .

ب) استنتج قيمة المجموع  $S'$  حيث  $S' = u_0 + u_1 + \dots + u_6$ .

التمرين الثالث: ( 08 نقاط )

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R} - \{1\}$  كما يلي:

(C) التمثيل البياني للدالة  $f$  في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

1) تحقق أنّ: من أجل كل عدد حقيقي  $x$  مختلف عن 1 ،  $f(x) = 2 + \frac{1}{2x-2}$

2) أ) احسب النهايات التالية :  $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

ب) استنتاج معادلتي المستقيمين المقاربين للمنحنى  $(C_f)$ .

3) أ) بين أنّ: من أجل كل عدد حقيقي  $x$  مختلف عن 1 ،  $f'(x) = \frac{-2}{(2x-2)^2}$

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها.

4) جد إحداثيات نقط تقاطع المنحنى  $(C_f)$  مع حاملي محوري الإحداثيات.

5) اكتب معادلة المماس  $(\Delta)$  للمنحنى  $(C_f)$  عند النقطة ذات الفاصلة 2 .

6) ارسم  $(\Delta)$  و  $(C_f)$ .

انتهى الموضوع الأول

## الموضوع الثاني

### التمرين الأول: (06 نقاط)

- (u<sub>n</sub>) متتالية حسابية معرفة على المجموعة  $\mathbb{N}$  بحدها الأول  $u_0 = -5$  و  $u_3 + u_7 = 50$ .
- 1) عين الأساس  $r$  للمتتالية (u<sub>n</sub>).
  - 2) بيّن أنّ: من أجل كل عدد طبيعي  $n$  ،  $u_n = 6n - 5$ .
  - 3) اثبّت أنّ العدد 2017 حد من حدود المتتالية (u<sub>n</sub>)، ماهي رتبته؟
  - 4) احسب بدلالة العدد الطبيعي  $n$  المجموع  $S$  حيث  $S = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ .

### التمرين الثاني: (06 نقاط)

- $c = 2017$  ،  $a$  ،  $b$  و  $c$  ثلاثة أعداد طبيعية حيث  $a \equiv -5[7]$  ،  $b \equiv 1966$  و  $c \equiv 2[7]$ .
- 1) عين باقي القسمة الإقلية لكل من الأعداد  $a$  ،  $b$  و  $c$  على 7.
  - 2) تحقق أنّ:  $b \equiv -1[7]$ .
  - 3) اثبّت أنّ العدد:  $b^{2017} + 3 \times c^{1438} - 2$  يقبل القسمة على 7.
  - 4) تحقق أنّ: من أجل كل عدد طبيعي  $k$  ،  $2^{3k+2} \equiv 4[7] \equiv 2[7] \equiv 2^{3k} \equiv 1[7]$  ثم استنتج أنّ:  $2^{3k+1} \equiv 2[7]$ .
  - 5) عين قيم العدد الطبيعي  $n$  حتى يكون  $3^{2^n} + 2$  قابلاً للقسمة على 7.


### التمرين الثالث: (08 نقاط)

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $\mathbb{R}$  بـ:  $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 4x$

- (C<sub>f</sub>) التمثيل البياني للدالة  $f$  في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ( $O; \vec{i}, \vec{j}$ ).
- 1) احسب النهايتين التاليتين:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ .
  - 2)  $f'(x) = (x-2)(x+2)$  ،  $x$  العدد حقيقي.
    - أ) بيّن أنّ: من أجل كل عدد حقيقي  $x$  ،  $f'(x) < 0$ .
    - ب) استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$ .
  - 3) شكل جدول تغيرات الدالة  $f$ .
  - 4) حل في  $\mathbb{R}$  المعادلة  $f(x) = 0$  ، استنتج احداثيات نقط تقاطع (C<sub>f</sub>) مع حاملي محوري الإحداثيات.
  - 5) بيّن أن (C<sub>f</sub>) يقبل نقطة انعطاف هي مبدأ المعلم.
  - 6) اكتب معادلة المماس (T) للمنحنى (C<sub>f</sub>) عند النقطة ذات الفاصلة 0.
  - 7) ارسم (T) و المحنى (C<sub>f</sub>).

المواضيع الأول		
التمرين الأول: (06 نقاط)		
1.50	3×0.5	$c \equiv 4[5]$ و $b \equiv 2[5]$ ، $a \equiv 1[5]$ (1)
1.50	3×0.5	$b^4 \equiv 1[5]$ و $a \times b \times c \equiv 3[5]$ ، $a + b + c \equiv 2[5]$ (2)
1.50	0.75	. $b^{4n} \equiv 1[5]$ (3)
1.50	0.75	ب) الاستنتاج: $b^{2016} - 1 \equiv 0[5]$ معناه $b^{2016} - 1 \equiv (b^{4 \times 504} - 1)[5]$ لدينا
1.50	0.50 01	. $c \equiv -1[5]$ (4)
1.50	0.50 01	ب) بيان أن: $c^{1438} + c^{2017} \equiv 0[5]$ .
التمرين الثاني: (06 نقاط)		
02	01 01	$\begin{cases} u_0 q = 20 \\ u_0 q^3 = 320 \end{cases} \quad (1)$ $\begin{cases} u_0 = 5 \\ q = 4 \end{cases} \quad \text{معناه}$
02	01 01	$u_n = 5 \times 4^n$ عبارة الحد العام: (2) $u_6 = 20480$
02	01 01	. $S = \frac{5}{3} [4^{n+1} - 1]$ (3) $S' = 27305$ (ب)
التمرين الثالث: (08 نقاط)		
0.50	0.50	(1) التحقق أن: من أجل كل عدد حقيقي $x$ يختلف عن 1 ، $f(x) = 2 + \frac{1}{2x-2}$
2.50	4×0.5 2×0.25	. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty$ $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ (أ) $y = 2$ ، $x = 1$ (ب) معادلتي المقاربين
1.75	0.50 0.75	$(3) \quad (أ) \text{ بيان أن: من أجل كل عدد حقيقي } x \text{ يختلف عن 1 ، } f'(x) = \frac{-2}{(2x-2)^2}$ $(ب) \text{ استنتاج اتجاه تغير الدالة } f \text{ بما أن } f'(x) < 0 \text{ فان } f \text{ متناقصة تماما جدول التغيرات.}$

01	2×0.5	$, (C_f) \cap (yy') = \left\{ B(0; \frac{3}{2}) \right\}, (C_f) \cap (xx') = \left\{ A(\frac{3}{4}; 0) \right\}$ (4)
0.75	0.75	$y = -\frac{1}{4}x + 3$ معادلة المماس (Δ) (5)
1.50	0.50	. (C_f) (Δ) و (6).



### الموضوع الثاني

#### التمرين الأول: ( 06 نقاط )

01	01	$r = 6$ : الأسس $r$ للمتالية $(u_n)$ (1)
1.50	1.50	. بيان أنّ: من أجل كل عدد طبيعي $n$ $u_n = 6n - 5$ (2)
1.50	1.50	$338 = u_{337}$ ، رتبته هي 2017 (3)
02	02	$S = (n+1)(3n-5)$ المجموع (4)

#### التمرين الثاني: ( 06 نقاط )

1.50	3×0.5	$c \equiv 1[7]$ و $b \equiv 6[7]$ ، $a \equiv 2[7]$ (1)
0.50	0.50	. التحقق أنّ: $b \equiv -1[7]$ (2)
01	01	$b^{2017} + 3 \times c^{1438} - 2 \equiv 0[7]$ (3)
02	01 2×0.5	التحقق أنّ: من أجل كل عدد طبيعي $2^{3k} \equiv 1[7]$ ، $k \in \mathbb{N}$ (4) استنتاج أنّ: $2^{3k+2} \equiv 4[7]$ و $2^{3k+1} \equiv 2[7]$ (5)
01	01	$n = 3k + 2$ / $k \in \mathbb{N}$ معناه $2^n + 3 \equiv 0[7]$ (5)

#### التمرين الثالث: ( 08 نقاط )

01	2×0.5	. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ (1)
1.50	01 0.50	(أ) بيان أنّ: من أجل كل عدد حقيقي $x$ ، $f'(x) = (x-2)(x+2)$ (2) ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة $f$ .

0.75	0.75	3) جدول تغيرات الدالة $f$ .
1.50	0.75 0.75	$S = \{0; 2\sqrt{3}; -2\sqrt{3}\}$ (4) $(C_f) \cap (xx') = \{A(2\sqrt{3}; 0), O(0; 0), B(-2\sqrt{3}; 0)\}$
1	1	5) بيان أن $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف هي مبدأ المعلم.
0.75	0.75	6) معادلة المماس $(T): y = -4x$
1.50	0.5 01	7) رسم $(T)$ والمنحنى $(C_f)$

