

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

دورة: 2021



الديوان الوطني لامتحانات والمسابقات
امتحان بكالوريا التعليم الثانوي
الشعبية: رياضيات

المدة: 04 س 30 د

اختبار في مادة: الرياضيات

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

المتالية العددية (u_n) معرفة بـ: $u_0 = -\frac{3}{2}$ و من أجل كل عدد طبيعي n :

$$u_{n+1} = -\frac{11}{4} + \frac{27}{4(-4u_n + 1)}$$

أ. تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $-2 < u_n < -1$

ب. برهن بالترافق أنه من أجل كل عدد طبيعي n : متقا正好 تماما ثم استنتاج أنها متقاربة.

ج. بين أن المتالية (u_n) متناقصة تماما ثم استنتاج أنها متقاربة.

2) المتالية العددية (v_n) معرفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ:

أ. بين أن المتالية (v_n) هندسية أساسها 3 ثم احسب حدها الأول.

ب. اكتب v_n بدلالة n ثم استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n :

ج. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

$$3) \text{ أ. تتحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي } n: \frac{3}{u_n + 2} - 2 = -v_n$$

ب. نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $S_n = \ln\left(\frac{3}{u_0 + 2} - 2\right) + \ln\left(\frac{3}{u_1 + 2} - 2\right) + \dots + \ln\left(\frac{3}{u_n + 2} - 2\right)$

احسب S_n بدلالة n

التمرين الثاني: (04 نقاط)

كيس به 12 كرية متماثلة لا نفرق بينها باللمس.

كل من الكريات الاشتري عشرة تحمل رقمها من بين الأعداد التالية: 1 ، 2 ، 3 ، 4
نسحب عشوائيا كرية واحدة من الكيس.

نرمز بـ: p_i إلى احتمال سحب كرية رقمها i ، حيث: $p_4 = \frac{1}{4}$ ، $p_3 = \frac{1}{4}$ ، $p_2 = \frac{1}{6}$ ، $p_1 = \frac{1}{3}$ و

1) وزع الكريات الاشتري عشرة حسب الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4

2) احسب احتمال كل من الحوادث A ، B و C الآتية:

" سحب كرية تحمل رقمها فرديا " A

" سحب كرية تحمل رقمها من أرقام نظام التعداد ذي الأساس 4 " B

" سحب كرية رقمها حل للمعادلة: $x^2 = 2^x$ " C

(3) المتغير العشوائي X يرفق بكل سحب لكرية الرقم الذي تحمله. عين مجموعة قيم المتغير العشوائي X ثم احسب $E(X)$ أمله الرياضياتي.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) نعتبر المعادلة ذات المجهول (y) : $42x - y = 38 \dots (E)$ ، حيث x و y عداد صحيحان. حل المعادلة (E) علما أن التالية $(1; 4)$ حل لها.

(2) a ، b و c أعداد طبيعية حيث a غير معروف. العدد الطبيعي N يكتب $\overline{ab0cb}$ في نظام تعداد أساسه 8 و يكتب $\overline{a7c5}$ في نظام تعداد أساسه 5 . بين أن الأعداد a ، b و c تحقق: $113a = 3(c - 42b + 151)$ ثم استنتج أن: $a = 3$

ب. جُد العددين الطبيعيين b و c ثم اكتب العدد N في النظام العشري.

(3) أ. ادرس تبعاً لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقلية للعدد 5^n على 6
ب. بين أنه من أجل كل عدد طبيعي n : $2021^{2n} + 1441^n + 4$ مضاعف للعدد 6
ج. نضع: $A_n = 2021^{2n} + 1441^n + 2 \times 1442^n$

جُد قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $A_n \equiv 0 [6]$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) الدالة العددية g معرفة على \mathbb{R} بـ: $g(x) = (x^2 - 3)e^x + 3$

(1) ادرس تغيرات الدالة g ثم شُكِّل جدول تغيراتها.

(2) أ. بين أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدًا α يتحقق: $1,53 < \alpha < 1,54$

ب. احسب $g(0)$ ثم استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

(II) الدالة العددية f معرفة على \mathbb{R} بـ: $f(x) = 3x + 1 + (x^2 - 2x - 1)e^x$

(C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(\bar{O}; \bar{i}, \bar{j})$

(1) احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$

(2) أ. بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$

ب. استنتج أن f متزايدة تماماً على كل من $[0; +\infty]$ و $[\alpha; -\infty]$ و متناظرة تماماً على $[\alpha; 0]$

ج. شُكِّل جدول تغيرات الدالة f

(3) أ. بين أن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 3x + 1$ مقارب مائل $f(C)$ عند $-\infty$

ب. ادرس وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ)

ج. بين أن (C) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β تتحقق: $2,03 < \beta < 2,04$

د. بين أن (C) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين لـ (Δ) (لا يطلب كتابة معادلة (T) و (T'))

(4) ارسم (Δ) ، (T) و (C) على $[-\infty; 1 + \sqrt{2}]$

(نأخذ: $f(-\sqrt{3}) \approx -3,2$ ، $f(\sqrt{3}) \approx -2,1$ ، $f(\alpha) \approx -2,3$ ، $\alpha \approx 1,53$)

(5) الدالة العددية h معرفة على المجال $[0; +\infty)$ بـ: $h(x) = f[\ln(x)]$

أ. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ و $\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)$

ب. ادرس اتجاه تغير الدالة h ثم شُكِّل جدول تغيراتها.

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

المتالية العددية (u_n) معرفة بـ: $u_0 = 1$ و من أجل كلّ عدد طبيعي n : $u_{n+1} = \sqrt{2 + \frac{1}{2}u_n^2}$

أ . برهن بالترابع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n : $0 < u_n < 2$

ب. بين أنّ المتالية (u_n) متزايدة تماماً ثمّ استنتج أنّها متقاربة.

(2) المتالية العددية (v_n) معرفة على \mathbb{N} بـ: $v_n = u_n^2 - 4$

أ . بين أنّ المتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ يُطلب حساب حدّها الأول.

ب. اكتب عبارة v_n بدلالة n ثمّ استنتج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n :

ج. احسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

(3) نضع من أجل كلّ عدد طبيعي n : $S_n = u_0^2 + u_1^2 + \dots + u_n^2$

أ . بين أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n :

$PGCD(2^n; 3 + n \times 2^{n+2}) = PGCD(2^n; 3)$: n

ج. استنتج أنّ: $PGCD(2^n; 3 + n \times 2^{n+2}) = 1$

د. جدّ قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $S_n = \frac{83}{8}$

التمرين الثاني: (04 نقاط)

يراد عشوائياً تشكيل لجنة تضمّ رئيساً ونائباً له من بين ثلاثة رجال H_1, H_2, H_3 و أربع نساء F_1, F_2, F_3, F_4

(1) بين أنّ عدد اللجان التي يمكن تشكيلها هو 42

(2) نعتبر الحوادث الآتية: "A" "اللجنة من نفس الجنس" "B" "اللجنة من جنسين مختلفين"

"C" هو الرئيس "H₁" "E" "اللجنة لا تضم كلاً من H_1 و F_1

أ . احسب $P(A)$ احتمال الحدث A ثمّ استنتج $P(B)$

ب. احسب $P(E)$ و $P(C)$

(3) المتغير العشوائي X يرفق بكلّ لجنة عدد الرجال فيها.

عِين قانون احتمال X ثمّ احسب $E(X)$ أمله الرياضي.

التمرين الثالث: (05 نقاط)

(1) نعتبر المعادلة ذات المجهول $(x; y)$: $7x - 6y = 1 \dots (E)$ ، حيث x و y عددان صحيحان.

أ . حلّ المعادلة (E) علماً أنّ الثانية (1) حلّ لها.

ب. تتحقق أنّه إذا كانت الثانية (x; y) حلّاً للمعادلة (E) فإنّ xy عدد طبيعي غير معدوم.

(2) أ . ادرس تبعاً لقيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقلية للعدد 4^n على 7

ب. بين أنّ العدد $2022^{2021} + 2019^{2022} \times 4$ يقبل القسمة على 7

(3) برهن بالترجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي غير معروف n : $4^n \equiv 4[6]$

(4) نفرض أنّ التّriation $(a; b)$ حلّ للمعادلة (E)

أ. عدد طبيعي يكتب في نظام التّعداد ذي الأساس 4 على الشّكل: $\overline{333\cdots 330}$ (عدد أرقامه b)
 $A = 4^{ab} - 4$. بين أنّ

ب. تَحَقَّق أنّ: $A \equiv 0[6]$ ثمّ عين كلّ التّriations $(a; b)$ التي من أجلها يكون A قابلاً للقسمة على 42

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) المستوى منسوب إلى معلم متعامد متجانس.

في الشّكل المقابل (C) و (Γ) هما على التّرتيب التّمثيلان البيانيان

(C) للذّالتين العدديتين المعرفتين على المجال $[-1; +\infty)$ بـ: $x \mapsto 2x(1+x)\ln(1+x)$ و $x \mapsto 1+x^2$

(Γ) و (Γ) يتقاطعان في نقطة وحيدة فاصلتها α تَحَقَّق: $0,78 < \alpha < 0,79$ الذّالة العددية g معرفة على المجال $[-1; +\infty)$ بـ:

$$g(x) = 1 + x^2 - 2x(1+x)\ln(1+x)$$

(1) بقراءة بيانية، حدد حسب قيم x من المجال $[-1; +\infty)$ وضعية (C) بالنسبة إلى (Γ)

(2) استنتاج حسب قيم x من المجال $[-1; +\infty)$ إشارة $g(x)$

(II) الذّالة العددية f معرفة على المجال $[-1; +\infty)$ بـ: $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}$

(C_f) تمثيلها البياني في المستوى منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس (O; \vec{i}, \vec{j}) (الوحدة: 2 cm)

(1) أ. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و بين أنّ: $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0$

ب. فسّر النّهايتيين هندسياً.

(2) أ. بين أنّه من أجل كلّ x من المجال $[-1; +\infty)$:

ب. استنتاج اتجاه تغيير الذّالة f ثمّ شكّل جدول تغييراتها.

ج. بين أنّ: $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ ثمّ استنتاج حصراً $f(\alpha)$

د. اكتب معادلة L (T) مماس المنحني (C_f) عند المبدأ O

(3) ارسم (T) و (C_f) (نأخذ: $f(\alpha) = 0,36$)

(4) الذّالة العددية h معرفة على \mathbb{R} بـ: $h(x) = \frac{\ln(1+|x|)}{1+x^2}$ تمثيلها البياني في المعلم السابق.

أ. بين أنّ الذّالة h زوجية.

ب. بين أنّ الذّالة h غير قابلة للاشتقاق عند الصفر ثمّ فسّر ذلك بيانياً.

ج. اشرح كيفية رسم (C_h) انطلاقاً من (C_f) ثمّ ارسمه.

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الأول)						
مجموعه	مجازأة							
التمرين الأول: (04 نقاط)								
01.25	0.25 0.50 0.25+0.25	<p>أ. التحقق : $u_{n+1} = -\frac{11}{4} + \frac{27}{4(-4u_n + 1)}$</p> <p>ب. البرهان بالترابع : $-2 < u_n < -1$</p> <p>ج. (u_n) متناقصة تماما ، (u_n) متقاربة.</p>						
02.00	0.50 0.25 0.50 0.50 0.25	<p>أ. هندسية أساسها 3 : $v_{n+1} = v_n \times 3$</p> <p>حدها الأول $v_0 = -4$</p> <p>ب. $v_n = -4 \times 3^n$</p> <p>استنتاج: $u_n = \frac{3}{2 + 4 \times 3^n} - 2$</p> <p>ج. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$</p>						
0.75	0.25 0.50	<p>أ. التتحقق: $\frac{3}{u_n + 2} - 2 = -v_n$</p> <p>ب. $S_n = (n+1) \ln 4 + \frac{(n+1)n}{2} \ln 3$</p>						
التمرين الثاني: (04 نقاط)								
01	0.25x4	<p>1) توزيع الكريات الاشتري عشرة حسب الأرقام 1 ، 2 ، 3 ، 4</p> <p>عدد الكريات التي تحمل الرقم 1 هو 4 ، عدد الكريات التي تحمل الرقم 2 هو 2</p> <p>عدد الكريات التي تحمل الرقم 3 هو 3 ، عدد الكريات التي تحمل الرقم 4 هو 3</p>						
02.25	3x0.75	<p>2) $p(C) = \frac{5}{12}$ ، $p(B) = \frac{3}{4}$ ، $p(A) = \frac{7}{12}$</p>						
0.75	0.25 0.50	<p>3) مجموعة قيم المتغير العشوائي X هي 1, 2, 3, 4</p> <p>استنتاج أن: $E(X) = \frac{29}{12}$</p>						
التمرين الثالث: (05 نقاط)								
01	01.00	<p>1) حل المعادلة $(x, y) = (k + 1, 42k + 4)$ $k \in \mathbb{Z}$ (E)</p>						
02.75	0.50 0.50 0.25 3x0.50	<p>2) أ. بيان أن الأعداد a ، b و c تحقق: $113a = 3(c - 42b + 151)$</p> <p>استنتاج أن: $a = 3$</p> <p>ب. $42b - c = 38$ تكافئ $113a = 3(c - 42b + 151)$ و $a = 3$</p> <p>. $N = 2021$ ، $c = 4$ و $b = 1$</p>						
01.25	0.50 0.50 0.25	<p>3) أ. بباقي القسمة الإقلية للعدد 5^n على 6</p> <table border="1" style="margin-left: 100px;"> <tr> <td>n</td> <td>2k</td> <td>2k+1</td> </tr> <tr> <td>الباقي</td> <td>1</td> <td>5</td> </tr> </table> <p>ب. $2021^{2n} + 1441^n + 4$ مضاعف للعدد 6</p> <p>ج. $A_n \equiv 0[6]$ يعني: n فردي</p>	n	2k	2k+1	الباقي	1	5
n	2k	2k+1						
الباقي	1	5						

العلامة	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)																						
مجموعه	مجازأة	التمرين الرابع: (07 نقاط)																					
01.50	0.25+0.25 0.25 0.25 0.25 0.25	<p>1(I) دراسة تغيرات الدالة g</p> $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 3$ $g'(x) = (x^2 + 2x - 3)e^x$ <p>اشارة $g'(x) < 0$: $g'(x) > 0$ على $[-3; 1]$ و $g'(x) = 0$ على $x = -3$ أو $x = 1$</p> <p>g متزايدة تماما على كل من $[-3; -1]$ و $[1; +\infty)$ و متناقصة تماما على $[-1; 1]$.</p> <p>جدول التغيرات.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th> <th>$-\infty$</th> <th>-3</th> <th>0</th> <th>1</th> <th>α</th> <th>$+\infty$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$g'(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> <td></td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td>3</td> <td>↗</td> <td>↘</td> <td>↗</td> <td>↘</td> <td>+</td> </tr> </tbody> </table>	x	$-\infty$	-3	0	1	α	$+\infty$	$g'(x)$	+	0	-	0	+		$g(x)$	3	↗	↘	↗	↘	+
x	$-\infty$	-3	0	1	α	$+\infty$																	
$g'(x)$	+	0	-	0	+																		
$g(x)$	3	↗	↘	↗	↘	+																	
01.00	0.50 0.25 0.25	<p>أ . $g(1.53) \times g(1.54) < 0$</p> <p>ب . $g(0) = 0$</p> <p>إشارة $g(x) > 0$ على $[\alpha; +\infty)$ و $g(x) < 0$ على $[-\infty; 0]$: $g(x) > 0$ على $x = \alpha$ أو $x = 0$ لما $g(x) = 0$</p>																					
0.50	0.25+0.25	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad (1) \quad (II)$																					
0.75	0.25 0.25 0.25	<p>أ . تبيان أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x : $f'(x) = g(x)$</p> <p>ب . استنتاج اتجاه تغير الدالة f</p> <p>ج . جدول تغيرات الدالة f</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th> <th>$-\infty$</th> <th>0</th> <th>α</th> <th>$+\infty$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$f'(x)$</td> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>$f(x)$</td> <td>$-\infty$</td> <td>↗</td> <td>↘</td> <td>↗</td> </tr> </tbody> </table>	x	$-\infty$	0	α	$+\infty$	$f'(x)$	+	0	-	0	$f(x)$	$-\infty$	↗	↘	↗						
x	$-\infty$	0	α	$+\infty$																			
$f'(x)$	+	0	-	0																			
$f(x)$	$-\infty$	↗	↘	↗																			
01.25	0.25 0.25 0.25 0.50	<p>أ . تبيان أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = 3x + 1$ مقارب مائل لـ (C) عند $-\infty$</p> <p>ب . وضعية (C) بالنسبة إلى (Δ) على (Δ) أعلى (Δ) على $[-\infty; 1 - \sqrt{2}]$</p> <p>و (C) أسفل (Δ) على $[1 - \sqrt{2}; 1 + \sqrt{2}]$ و (C) أعلى (Δ) على $[1 + \sqrt{2}; +\infty]$</p> <p>يقطع (Δ) عند $(1 - \sqrt{2}; 3\sqrt{2} + 4)$ و $(1 + \sqrt{2}; -3\sqrt{2} + 4)$</p> <p>ج . تبيان أنّ (C) يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها β</p> <p>تحقق: $2,03 < \beta < 2,04$</p> <p>د . تبيان أنّ (C) يقبل مماسين (T) و (T') موازيين لـ (Δ)</p>																					

العلامة	عنصر الإجابة (الموضوع الأول)
مجموعه	مجزأة
01.00	<p>0.25x3</p> <p>0.25</p> <p>(T') ، (T) ، (Δ) رسم (C) على] -∞ ; 1 + √2 [(4)</p> <p>01.00</p> <p>0.25+0.25</p> <p>0.25</p> <p>$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$ و $\lim_{x \geq 0} h(x) = -\infty$. (5)</p> <p>بـ. h متزايدة تماما على كل من $[0; 1]$ و $[1; e^\alpha]$ و متناقصة تماما على $[e^\alpha; +\infty]$</p> <p>جدول تغيراتها.</p> <p>01.00</p> <p>0.25</p>

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)								
مجموعه	جزأة	التمرين الأول: (04 نقاط)								
التمرين الأول: (04 نقاط)										
01.25	0.50 0.25+0.50	<p>أ) البرهان بالترجع : $0 < u_n < 2$</p> <p>ب. (u_n) متزايدة تماما ، (u_n) متقاربة.</p>								
01.25	0.25+0.25 0.25+0.25 0.25	<p>أ) هندسية أساسها $v_0 = -3$ ، $\frac{1}{2}$ (2)</p> <p>ب. $u_n = \sqrt{4 - 3(\frac{1}{2})^n}$ ، $v_n = -3(\frac{1}{2})^n$</p> <p>ج. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$</p>								
01.50	0.50 0.25 0.25 0.25	<p>أ. تبيان أنه من أجل كل عدد طبيعي $S_n = \frac{n \times 2^{n+2} + 3}{2^n} - 2 : n$</p> <p>ب. تبيان أن $PGCD(2^n; 3 + n \times 2^{n+2}) = PGCD(2^n; 3)$</p> <p>ج. استنتاج أن $PGCD(2^n; 3 + n \times 2^{n+2}) = 1$</p> <p>د. إيجاد قيمة العدد الطبيعي n التي من أجلها يكون: $S_n = \frac{83}{8}$</p> <p>$99 \times 2^n = 8(3 + n \times 2^{n+2})$ يعني $S_n = \frac{83}{8}$</p> <p>نجد: $n = 3$</p>								
التمرين الثاني: (04 نقاط)										
0.50	0.50	<p>1) عدد اللجان التي يمكن تشكيلها هو 42</p>								
02	0.50+0.50 0.50+0.50	<p>أ) $P(B) = 1 - P(A) = \frac{4}{7}$ و $P(A) = \frac{18}{42} = \frac{3}{7}$ (2)</p> <p>ب. $P(E) = \frac{20}{42} = \frac{10}{21}$ و $P(C) = \frac{6}{42} = \frac{1}{7}$</p>								
01.50	0.25 0.75 0.50	<p>3) قانون احتمال مجموعه قيم X هي: $\{0; 1; 2\}$</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x_i</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>$P(X = x_i)$</td> <td>$\frac{12}{42}$</td> <td>$\frac{24}{42}$</td> <td>$\frac{6}{42}$</td> </tr> </table> <p>$E(X) = \frac{6}{7}$ أمله الرياضياتي:</p>	x_i	0	1	2	$P(X = x_i)$	$\frac{12}{42}$	$\frac{24}{42}$	$\frac{6}{42}$
x_i	0	1	2							
$P(X = x_i)$	$\frac{12}{42}$	$\frac{24}{42}$	$\frac{6}{42}$							

العلامة		عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)											
مجموعه	مجازأة	التمرين الثالث: (05 نقاط)											
التمرين الرابع: (07 نقاط)													
01.25	0.75 0.50	$(x; y) = (6k+1, 7k+1) \quad k \in \mathbb{Z} \quad : (E)$ <p>ب. التتحقق أن xy عدد طبيعي غير معدوم يكفي أن ثبت $0 < (6k+1)(7k+1)$</p>											
01.25	0.75 0.50	<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>n</td> <td>$3k$</td> <td>$3k+1$</td> <td>$3k+2$</td> </tr> <tr> <td>بواقي قسمة 4^n على 7</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>2</td> </tr> </table>	n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$	بواقي قسمة 4^n على 7	1	4	2	<p>أ. بواقي قسمة 4^n على 7</p> <p>ب. يقبل القسمة على 7</p>		
n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$										
بواقي قسمة 4^n على 7	1	4	2										
	$4 \times 2019^{2021} + 2022^{2022}$ <p>(3) البرهان بالترابع $4^n \equiv 4[6]$</p>												
02				0.50	<p>أ. تبيان أن: $A = 4^{ab} - 4$</p> $A = 0 \times 4^0 + 3 \times 4^1 + \dots + 3 \times 4^{ab-1} = 3 \times (4^1 + \dots + 4^{ab-1})$ <p>ب. التتحقق أن: $A \equiv 0[6]$</p> <p>تعين الثنائيات $(a; b)$ التي من أجلها يكون A قابلاً للقسمة على 42</p> $k = 3h \quad h \in \mathbb{N} \quad 4^{k+1} \equiv 4[7] \quad \text{أي } A \equiv 0[7] \quad \text{و منه } A \equiv 0[42]$ <p>($a; b) = (18p+1; 21p+1)$ $p \in \mathbb{N}$ و منه :</p>								
	0.50		<p>(4) أ. تبيان أن: $A = 4^{ab} - 4$</p> $A = 0 \times 4^0 + 3 \times 4^1 + \dots + 3 \times 4^{ab-1} = 3 \times (4^1 + \dots + 4^{ab-1})$ <p>ب. التتحقق أن: $A \equiv 0[6]$</p> <p>تعين الثنائيات $(a; b)$ التي من أجلها يكون A قابلاً للقسمة على 42</p> $k = 3h \quad h \in \mathbb{N} \quad 4^{k+1} \equiv 4[7] \quad \text{أي } A \equiv 0[7] \quad \text{و منه } A \equiv 0[42]$ <p>($a; b) = (18p+1; 21p+1)$ $p \in \mathbb{N}$ و منه :</p>										
	01		<p>(2) إشارة $g(x)$</p> $g(x) < 0 \quad \text{على }]-\infty; \alpha[\quad g(x) > 0 \quad \text{على }]\alpha; +\infty[$ <p>$x = \alpha$ لما $g(x) = 0$</p>										
01.50	0.25+0.25 0.25	<p>أ. تبيان أن $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ ، $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$</p> <p>ب. معادلتا مستقيمان مقاربان للمنحنى (C_f)</p>											
	0.50 0.50	<p>(2) تبيان أن $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)(1+x^2)^2}$</p> <p>ب. f متزايدة تماماً على $[\alpha; +\infty[$ ومتناقصة تماماً على $]-1; \alpha[$</p>											
<p>جدول تغيراتها الدالة f.</p>													

العلامة	مجموعه	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)
العلامة	مجموعه	مجراً
0.75	0.25	$f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(1+\alpha)}$ ج.
0.75	0.25	$0.35 < f(\alpha) < 0.36$
0.75	0.25	$y = x$: (T) د. معادلة لـ (T)
0.75	0.25	
0.75	0.50	(T) رسم (5) (C_f) رسم
01.75	0.25	أ. الدالة h زوجية.
01.75	0.25+0.25	ب. h غير قابلة للاشتقاق من أجل الصفر التفسير: وجود نصفي مماسين في المبدأ
01.75	0.25	ج. (C_h) ينطبق على (C_f) على $[0; +\infty)$ ثم نتم الرسم بالتناطر بالنسبة إلى حامل محور التراتيب.
01.75	0.50	
01.75	0.50	(C_f) انطلاقاً من (C_h) رسم