

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين الآتيين:
الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد و المتاجنس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقطة $A(1; -1; 2)$ والمستوى (P)

$$\begin{cases} x + y - 9 = 0 \\ y + z - 4 = 0 \end{cases}$$

ذا المعادلة $x - y + z + 2 = 0$ والمستقيم (D) المعروف بـ :

- 1) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (D) .
- 2) جد معادلة ديكارتية للمستوى (P') الذي يشمل A ويوازي (P) .
- 3) أثبت أن (D) يقطع (P') في النقطة A' حيث $(6; 3; 1)$.
- 4) عين تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) الذي يشمل A ويوازي (P) ويقطع (D) .

التمرين الثاني: (04 نقاط)

(u_n) و (v_n) متاليتان معرفتان على مجموعة الأعداد الطبيعية \mathbb{N} كما يلي:

$$v_n = \frac{u_n + 2}{1 - u_n} \quad u_0 = \frac{1}{4} \quad u_{n+1} = 3 - \frac{10}{u_n + 4}$$

و من أجل كل عدد طبيعي n ،

أ) برهن بالترابع أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 < u_n < 1$.

ب) بيّن أن المتالية (u_n) متزايدة تماما ثم استنتج أنها متقاربة.

أ) بيّن أن المتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{2}$ ثم عبر عن حدّها العام v_n بدالة n .

ب) أثبت أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_n = 1 - \frac{3}{v_n + 1}$ ثم استنتج النهاية.

التمرين الثالث: 05 نقاط

(I) حل في مجموعة الأعداد المركبة \mathbb{C} المعادلة: $0 = (z+2)(z^2 - 4z + 8)$.

(II) المستوى المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

نعتبر النقط A , B , C التي لاحقاتها: $z_A = 2 - 2i$, $z_B = \bar{z}_A$, $z_C = -2$.

(1) اكتب كلا من z_A و z_B على الشكل الأسني.

(2) عين z_D لاحقة النقطة D حتى تكون النقطة B مركز ثقل المثلث ACD .

(3) (Γ) مجموعة النقط M من المستوى ذات الاحقة z (M تختلف عن A و B) حيث $\arg\left(\frac{z_B - z}{z_A - z}\right) = \frac{\pi}{2}$.

تحقق أن مبدأ المعلم O هو نقطة من (Γ) ثم عين طبيعة المجموعة (Γ) وأنشئها.

(4) ليكن h التحاكي الذي مرکزه النقطة C ونسبة 2 ، (Γ') صورة (Γ) بالتحاكي h عين طبيعة المجموعة (Γ') مع تحديد عناصرها المميزة.

التمرين الرابع: 07 نقاط

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على D حيث $D =]-\infty; -1] \cup [1; +\infty[$.

(C_f) التمثيل البياني للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس ($O; \vec{i}, \vec{j}$).

(1) بين أن الدالة f فردية ثم فسر ذلك بيانيا.

(2) احسب النهايات التالية : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$ ، $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$.

استنتج أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب.

(3) أ) بين أنه من أجل كل x من D ، $f'(x) = \frac{2}{3} \left(\frac{x^2 + 2}{x^2 - 1} \right)$.

ب) استنتاج اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(4) بين أن المعادلة $0 = f(x)$ تقبل حلًا وحيدًا α حيث $1,8 < \alpha < 1,9$.

(5) بين أن المستقيم (Δ) ذا المعادلة: $y = \frac{2}{3}x$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) ثم أدرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ).

(6) أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f).


(7) m وسيط حقيقي، ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد حلول المعادلة:

$$(2 - 3|m|)x + 3 \ln\left(\frac{x - 1}{x + 1}\right) = 0$$

الموضوع الثاني

التمرين الأول: (04 نقاط)

- الفضاء منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ ، نعتبر النقط $A(3;0;0)$ ، $B(0;2;0)$ ، $C(0;0;1)$.
- (1) بين أن النقط A ، B و C تعيّن مستويًا، ثم تحقق أن: $2x + 3y + 6z - 6 = 0$ معادلة للمستوى (ABC) .
 - (2) اكتب تمثيلا وسيطياً للمستقيم (Δ) العمودي على المستوى (ABC) والذي يشمل المبدأ O .
 - (3) جد إحداثيات H نقطة تقاطع (Δ) و (ABC) .
 - (4) بيان أن (BH) عمودي على (AC) ، ثم استنتج أن H هي نقطة تلاقي أعمدة المثلث ABC .



التمرين الثاني: (04 نقاط)

- المستوى منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.
- $f(x) = \frac{3x - 16}{x + 11}$ كما يلي: f الدالة المعرفة على المجال $[-4; 1]$.
- ولتكن (C_f) المنحني الممثل لها، (Δ) المستقيم ذو المعادلة $x = y$.
- (I) تتحقق أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-4; 1]$. ثم بين أن:
- من أجل كل $x \in [-4; 1]$ فإن $f(x) \in [-4; 1]$

- (II) متتالية معرفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = f(u_n)$.
- (1) انقل الشكل المقابل ثم مثل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 (لا يطلب حساب الحدود) ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.
 - (2) برهن بالترابع أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $-4 < u_n \leq 0$ ، ثم بين أن المتتالية (u_n) متاقضة تماما.
 - (3) لتكن المتتالية العددية (v_n) المعرفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n ، $v_n \times u_n = 1 - 4v_n$.
- أثبتت أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{7}$ ، ثم احسب المجموع S حيث
- $$S = v_0 \times u_0 + v_1 \times u_1 + \dots + v_{2016} \times u_{2016}$$

التمرين الثالث: (05 نقاط)

المستوي المركب منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{u}, \vec{v})$.

أجب ب صحيح أو خطأ مع التعليل في كل حالة مما يلي:

$$(1) \text{ مجموعـة حلول المعادلة } z^2 = 1 \text{ هي } S = \left\{ -\frac{1}{2} + i \right\}$$

$$(2) \text{ من أجل كل عدد مركب } z, (z+2)(\bar{z}+2) = |z+2|^2.$$

$$(3) \text{ من أجل كل عدد طبيعي } n, \left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{3n} = 1$$

$$(4) S \text{ التشابه المباشر الذي مركزه النقطة } \Omega \text{ ذات اللاحقة 1 ونسبة 3 وزاويته } \frac{\pi}{2}$$

صورة الدائرة (C') ذات المركز $(0; 1)$ ونصف القطر 3 بالتشابه S هي الدائرة (C) ذات المركز $(-2; -3)$ ونصف القطر 9.

(5) من أجل كل عدد حقيقي α : إذا كان $(\sin \alpha + i \cos \alpha) \times (\cos \alpha - i \sin \alpha)$

$$\text{فإن: } \arg(Z) = \frac{\pi}{2} - 2\alpha + 2k\pi, \text{ حيث } k \text{ عدد صحيح.}$$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

(I) نعتبر الدالة العددية f المعرفة على \mathbb{R} كما يلي:

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس (\vec{i}, \vec{j}) .

$$(1) \text{ بين أن } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2 \text{ وأعط تقسيرا هندسيا لهذه النتيجة، ثم احسب النهاية } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x).$$

$$(2) \text{ أ) بين أنه من أجل كل } x \in \mathbb{R}, f'(x) = x(x-2)e^{1-x}.$$

ب) ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) اكتب معادلة لـ (T) المماس للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

(II) نعتبر الدالة العددية h المعرفة على \mathbb{R} كما يلي:

(1) بين أنه من أجل كل $x \in \mathbb{R}$: $h(x) \geq 0$, ثم ادرس الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T) .

(2) بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيدا حيث $-0,7 < \alpha < -0,6$.

(3) أنشئ المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-1; +\infty]$.

(4) الدالة المعرفة على \mathbb{R} كما يلي: $F(x) = 2x + (x^2 + 2x + 2)e^{1-x}$.

تحقق أن F دالة أصلية للدالة f على \mathbb{R} , ثم احسب مساحة الحيز المستوى المحدد بالمنحنى (C_f)

وحامـل محـورـ الفـواصـلـ والـمسـتـقـيمـيـنـ اللـذـيـنـ مـعـادـلـتـيـهـماـ: $x=0$ و $x=1$.

الموضع نوع الأول

التمرين الأول: (04 نقاط)

01	01	$\begin{cases} x = -\lambda + 9 \\ y = \lambda \\ z = -\lambda + 4 \end{cases}$ <p>1) التمثيل الوسيطي للمستقيم (D)</p>
01	01	$x - y + z - 4 = 0$. (P') الذي يشمل A ويوازي (P) .
01	01	$. A' (6;3;1)$ في النقطة A' حيث (P') يقطع (D)
01	01	(Δ) التمثيل الوسيطي للمستقيم


التمرين الثاني: (04 نقاط)

01	01	$0 < u_n < 1$. البرهان بالترابع أنّ: من أجل كل عدد طبيعي n
01	0.75 0.25	$u_{n+1} - u_n = \frac{(1-u_n)(u_n+2)}{u_n+4} > 0$ مترابدة تماما
01	0.50 0.25 0.25	$\text{بما أن } (u_n) \text{ مترابدة تماماً ومحدودة من الأعلى فإنها متقاربة}$
01	0.50 0.50	$\text{أ) بيان أنّ: من أجل كل عدد طبيعي } n \text{ و منه المتتالية } (v_n) \text{ هندسية أساسها } \frac{5}{2} \text{ . } v_0 = 3$ $v_n = 3 \left(\frac{5}{2} \right)^n$ عبارة حدها العام :

01	0.25 0.75	$u_n = 1 - \frac{3}{v_n + 1}$ ، n $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$ استنتاج النهاية
0.50	2×0.25	$\Delta = -16$ (I)
01	01	$S = \{-2; 2 - 2i; 2 + 2i\}$ حل المعادلة:
	0.25	$z_B = 2\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$ و $z_A = 2\sqrt{2}e^{-i\frac{\pi}{4}}$ (1) الشكل الأسوي:

	0.25 0.50	<p>$(\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ / $k \in \mathbb{Z}$</p> <p>هي مجموعة النقط M من المستوى حيث M هي نصف الدائرة المفتوحة التي حداها A و B وقطرها AB وتشمل O إنشاء (Γ)</p>
1.25	0.25	
1.25	0.50 0.25 0.50	<p>العبارة المركبة للتحاكي h هي: $z' = 2z + 2$</p> <p>المجموعة (Γ') هي نصف الدائرة المفتوحة التي حداها نقطتين A' و B' والتي تشمل ω ذات اللاحقة 2 حيث $z_{A'} = 6 - 4i$; $z_{B'} = 6 + 4i$</p>
التمرين الرابع: (07 نقاط)		
0.75	0.50 0.25	<p>(1) بيان أن الدالة f فردية</p> <p>التسير البياني: المبدأ O مركز تاظر للمنحي (C_f)</p>
1.50	0.25×4 2×0.25	<p>$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ (2)</p> <p>$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$</p> <p>من النهايات السابقة نستنتج أن (C_f) يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور التراتيب معادلتيهما $x = -1$; $x = 1$</p>
	0.50	<p>(3) بيان أن من أجل كل x من D</p> $f'(x) = \frac{2}{3} \left(\frac{x^2 + 2}{x^2 - 1} \right)$

1.25	0.25	<p>ب) اتجاه تغير الدالة f : f متزايدة تماما على كل مجال من D</p> <p>جدول تغيراتها</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th><th>$-\infty$</th><th>-1</th><th>1</th><th>$+\infty$</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$f'(x)$</td><td>+</td><td></td><td></td><td>+</td></tr> <tr> <td>$f(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>$+ \infty$</td><td></td><td>$-\infty$</td></tr> </tbody> </table>	x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	$f'(x)$	+			+	$f(x)$	$-\infty$	$+ \infty$		$-\infty$
x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$													
$f'(x)$	+			+													
$f(x)$	$-\infty$	$+ \infty$		$-\infty$													
0.75	0.75	<p>4) بيان أن المعادلة $0 = f(x)$ تقبل حلا وحيدا α حيث: $1.8 < \alpha < 1.9$.</p>															
01	0.50	<p>$\lim_{ x \rightarrow +\infty} \left[f(x) - \frac{2}{3}x \right] = \lim_{ x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) = 0$: (Δ) (5)</p>															
	0.50	<p>الوضع النسبي: (Δ) من اجل $x > -1$ و (C_f) فوق (Δ) (Δ) من اجل $x > 1$ و (C_f) تحت (Δ)</p>															
0.75	0.75	<p>6) إنشاء المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) .</p>															
01	0.25	<p>$f(x) = m x + 3 \ln \left(\frac{x-1}{x+1} \right) = 0$ (7)</p> <p>حلول المعادلة هي فوائل نقط تقاطع $y = m x$ مع المستقيم ذو المعادلة</p>															
	0.25	<p>$m \in \left[-\infty; -\frac{2}{3} \right] \cup \left[\frac{2}{3}; +\infty \right]$ إذا كان</p>															
	2×0.25	<p>$m \in \left[-\frac{2}{3}; \frac{2}{3} \right]$ إذا كان</p>															

		الموضوع	التمرين الأول: (04 نقاط)
1.25	0.50		(1) بيان أن النقاط A ، B و C تعيّن مستوى (ABC) معايير المستوى $2x + 3y + 6z - 6 = 0$ للتحقق أن: يكفي التأكيد ان إحداثيات النقاط A ، B و C تحقق المعايير المعطاة
	0.75		
0.50	0.50		(2) التمثيل الوسيطي للمسقط Δ : $\begin{cases} x = 2t \\ y = 3t \\ z = 6t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$
01	01		(3) إحداثيات H : $H\left(\frac{12}{49}; \frac{18}{49}; \frac{36}{49}\right)$
1.25	0.50		(4) اثبات أن: $\vec{AC} \cdot \vec{BH} = 0$
	0.75		نقطة تلاقي الاعمد: يكفي اثبات $\vec{CH} \cdot \vec{AB} = 0$ او $\vec{AH} \cdot \vec{BC} = 0$
التمرين الثاني: (04 نقاط)			
0.75	0.25		I) التتحقق أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[-4; 1]$
	0.50		اثبات ان: من أجل كل $x \in [-4; 1]$ فإن $f(x) \in [-4; 1]$
01	0.50		(II) (1) تمثيل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 على حامل محور الفواصل 
	2×0.25		التخمين: (u_n) متاقصة تماما ومتقاربة
1.25	0.75		(2) البرهان بالترجع أن: من أجل كل عدد طبيعي n ، $-4 < u_n \leq 0$ ، $u_{n+1} - u_n = -\frac{(u_n + 1)^2}{u_n + 1} < 0$ بيان أن المتالية (u_n) متاقصة تماما
	0.50		
01	0.50		(3) اثبات أن: (v_n) حسابية : $v_{n+1} = v_n + \frac{1}{7}$ حساب المجموع : $S = -1161792$
	0.50		

التمرين الثالث: (05 نقاط)

01	0.25 0.75	$S = \left\{ -\frac{1}{2} + i \right\}$. (صحيحة) في المجموعة \mathbb{C} هي مجموع حلول المعادلة $\left(\frac{z+1-i}{z-i} \right)^2 = 1$
01	0.25 0.75	(صحيحة) $(z+2) \times (\bar{z}+2) = z+2 ^2$ من أجل كل عدد مركب z ,
01	0.25 0.75	. (خاطئة) $\left(\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)^{3n} = 1$ من أجل كل عدد طبيعي n ,
01	0.25 0.75	(صحيحة) صورة الدائرة ذات المركز $(C') (0;1)$ ونصف القطر 3 بالتشابه S هي الدائرة ذات المركز $(C) (-2;-3)$ ونصف القطر 9
01	0.25 0.75	(صحيحة) إذا كان α عدداً حقيقياً فإن $Z = (\sin \alpha + i \cos \alpha) \times (\cos \alpha - i \sin \alpha)$

التمرين الرابع: (07 نقاط)

01	0.50 0.25 0.25	$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ (بيان أن) القسيس هندسي: (C_f) يقبل مستقيماً مقارياً يوازي حامل محور الفواصل معادلته $y = 2$ حساب النهاية: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$																
1.50	0.50 0.50	(أ) بيان أن: من أجل كل x من \mathbb{R} , $f'(x) = x(x-2)e^{1-x}$. (ب) اتجاه تغير الدالة f : الدالة f متزايدة تماماً على $[2; +\infty]$ ومتناقصة تماماً على $[0; 2]$ جدول التغيرات:																
	0.50	<table border="1"> <thead> <tr> <th>x</th> <th>$-\infty$</th> <th>0</th> <th>2</th> <th>$+\infty$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <th>$f'(x)$</th> <td>+</td> <td>0</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>+</td> </tr> <tr> <th>$f(x)$</th> <td>$-\infty$</td> <td>0</td> <td>$f(2)$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> </tbody> </table>	x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	$f'(x)$	+	0	-	0	+	$f(x)$	$-\infty$	0	$f(2)$	$+\infty$
x	$-\infty$	0	2	$+\infty$														
$f'(x)$	+	0	-	0	+													
$f(x)$	$-\infty$	0	$f(2)$	$+\infty$														
0.50	0.50	(T): $y = -x + 2$ معادلة المماس (3)																

	0.50	<p>(I) تبيان أن من أجل كل x من \mathbb{R} فإن: $h(x) \geq 0$.</p> <table border="1"> <tr> <td>x</td><td>$-\infty$</td><td>1</td><td>$+\infty$</td></tr> <tr> <td>$h'(x)$</td><td>-</td><td>0</td><td>+</td></tr> <tr> <td>$h(x)$</td><td colspan="3"> </td></tr> </table>	x	$-\infty$	1	$+\infty$	$h'(x)$	-	0	+	$h(x)$			
x	$-\infty$	1	$+\infty$											
$h'(x)$	-	0	+											
$h(x)$														
1.25	0.25	<p>دراسة الوضع النسبي للمنحنى (C_f) والمماس (T). $f(x) - y = xh(x)$</p>												
	0.50	<p>فوق (C_f) على $]-\infty; 0[$ ، تحت (T) على $]0; 1[\cup]1; +\infty[$ (C_f) يقطع (ت) في نقطتين $A(1; 1); B(0; 2)$ (C_f)</p>												
0.75	0.75	<p>(1) بيان أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلًا وحيدا α حيث $-0,7 < \alpha < -0,6$. وذلك بواسطة مبرهنة القيم المتوسطة ورتابة الدالة</p>												
01	0.25	<p>(2) إنشاء المماس (T) والمنحنى (C_f) على المجال $[-1; +\infty[$.</p>												
01	0.75													
01	0.50	<p>التحقق أن F دالة أصلية لدالة f على \mathbb{R}: $F'(x) = f(x)$</p>												
	0.50	<p>حساب المساحة $S = \int_0^1 f(x) dx = F(1) - F(0) = (7 - 2e) u.a$</p>												